


# Identificación y manejo de anafilaxia por aplicación de vacuna contra SARS-CoV-2



## VACUNACIÓN



### Semáforo de Pacientes con condiciones especiales que se aplicarán la vacuna tipo mRNA para SARS-CoV-2

PUEDEN VACUNARSE	PRECAUCIÓN AL VACUNARSE	CONTRAINDICACIÓN PARA VACUNARSE
<b>Padecimientos o condiciones</b>	<b>Padecimientos o condiciones</b>	<b>Padecimientos o condiciones</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunocompromiso</li> <li>• Embarazo</li> <li>• Lactancia</li> <li>• Historia de alergia pero no relacionada a los componentes de la vacuna, o a otras vacunas o a tratamientos inyectados o apolisorbatos. <i>Ejemplos:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alergia a medicamentos orales</li> <li>- Historia de alergia a alimentos, aeroalergenos, látex, venenos de insectos</li> <li>- Historia familiar de alergias</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enfermedad aguda moderada a grave</li> <li>• Historia de cualquier reacción alérgica inmediata a tratamientos inyectados o a vacunas, <b>EXCEPTO</b> si se trata de componentes relacionados a la vacuna como polietilenglicol o polisorbato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reacción previa grave o inmediata (de cualquier grado de gravedad):                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- A la misma vacuna</li> <li>- A los fármacos que cuentan con los componentes de la vacuna (polietilenglicol o polisorbato 80)</li> </ul> </li> </ul>
<b>Acciones a seguir</b>	<b>Acciones a seguir</b>	<b>Acciones a seguir</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Observación por <b>15 minutos</b> después de la aplicación de la vacuna</li> </ul>	<p>En caso de enfermedad aguda moderada a grave, se puede considerar retrasar la vacunación hasta resolverse</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si se vacuna, se requiere observación por <b>15 minutos</b></li> </ul> <p>En caso de alergia ya mencionada, se puede considerar retrasar la vacunación o referir a un alergólogo-inmunólogo para su <b>valoración</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si se vacuna, se requiere observación por <b>30 minutos</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>No vacunar</b></li> <li>• Referir a un alergólogo-inmunólogo para abordaje diagnóstico y valoración personalizada</li> </ul>



GOBIERNO DE MÉXICO

SALUD  
SECRETARÍA DE SALUD